

技术中心团委响应号召积极战『疫』

本报讯(通讯员 郑淑珍)为贯彻落实公司关于精准复工后疫情防控各项措施,技术中心党委高度重视,制定了详细疫情防控措施。关键时期,党有号召、团必有应,该单位团委及时成立了由27名青年团员组成的“防疫青年突击队”,为精准复工后的疫情防控贡献青春力量。

提高防疫意识。为了能让职工快速了解、掌握疫情防控文件精神,“防疫青年突击队”将《关于做好复工前后疫情防控工作的安排》编辑成10条“一图读懂”的文件,并利用微信等自媒体工具进行宣传,做到全覆盖、全掌握;及时将《关于协助维护食堂就餐秩序的通知》设计成生动形象的宣传海报,张贴在餐厅入口醒目位置,达到了一目了然的效果;为了传播抗疫正能量,“防疫青年突击队”采编了《防控疫情 人人有责 武汉加油 中国加油》的宣传视频,引导职工正确防护,提高职工防疫意识。

积极采取行动。自“防疫青年突击队”成立以来,始终发扬“砖头精神”,做到哪里需要哪里搬。协助疫情防控领导小组办公室在公共区域悬挂条幅、海报等标语;结合实际情况,制定科学的公共区域消毒计划,协助疫情防控领导小组办公室定点对车棚、食堂、会议室等公共场所进行消毒;坚持每日安排五名队员维持餐厅就餐秩序,督促职工遵守错峰就餐规定,督导职工做好疫情防控措施,切实把职工群众的生命安全和身体健康放在第一位。

“我们组建的‘防疫青年突击队’由近年来入职的高学历人才组成,不仅是疫情防控的主力军,也是公司科技攻关队伍中的新生力量,我们承诺,在做好疫情防控的基础上,要以昂扬的斗志、全力以赴投入到技术研发工作中去,为公司技术创新贡献力量。”该单位团委书记周杰激动地说。

加工厂基层团支部开展战『疫』活动

本报讯(通讯员 郭俊)为全力做好新冠病毒防控工作,有效解决职工生活难题,废钢加工作业区团支部发起“换个发型,焕然一新”的活动,帮助作业区职工理发。

在疫情防控期间,面对市场理发厅的停业,部分职工找不到理发的地方而产生心理焦虑。废钢加工作业区团支部组织有理发经验的青工,使用自购的电动推子,在戴好口罩及防护的情况下利用下班闲余时间为职工进行理发,为他们修剪出满意的发型,帮助他们解决生活中的难题,为作业区贡献自己的力量。



中国疾控中心提示:
新型冠状病毒肺炎
办公场所预防
临时指南

新型冠状病毒肺炎
公众预防指南之
(办公场所篇)

新型冠状病毒肺炎是一种新发疾病,科学家对该疾病的认识在不断深入。现根据目前的认识水平制定本临时指南,适用于办公场所预防控制使用。



一 办公场所日常预防措施

01 建立个人健康申报制度,如员工出现发热、乏力、咳嗽、咽痛、胸闷、呼吸困难、恶心呕吐、腹泻、结膜炎、肌肉酸痛等可疑症状不要带病上班,应及时就医。

02 办公场所入口应设立体温检测点,出入办公场所人员应检测体温,体温超过37.3度不得入内。



03 办公场所内应当加强通风换气,保持室内空气流通,首选自然通风,尽可能打开门窗通风换气,也可采用机械排风。如使用空调,应保证空调系统供风安全,保证充足的新风输入,所有排风直接排到室外。当空调通风系统为全空气系统时,应当关闭回风阀,采用全新风方式运行。

04 应确保办公场所内洗手设施运行正常,配备速干手消毒剂,有条件时可配备感应式手消毒设施。



05 公共物品及公共区域(地面、走廊、卫生间、电梯等)定时清洁消毒。

06 保持环境卫生清洁,及时清运垃圾。

07 同一办公空间内有多人时,建议佩戴一次性使用医用口罩,保持适度距离(提倡保持1米以上距离)。

08 保持手卫生。减少接触公共场所的公共物品和部位;从公共场所返回、咳嗽用手捂之后、饭前便后,用洗手液(肥皂)流水洗手,或者使用速干手消毒剂;不确定手是否清洁时,避免用手接触口鼻眼。

09 打喷嚏或咳嗽时用纸巾、手绢等遮挡口鼻,防止唾液飞溅,临时无纸巾、手绢时用手肘衣服遮住口鼻。使用后的纸巾应丢到垃圾桶。打喷嚏或咳嗽后应立即用流水清洗双手或免洗消毒液进行手消毒。



10 推广健康的生活方式,适当运动,避免久坐。

11 疫情流行期间,建议尽量通过网络采用远程视频、电话等方式召开会议。建议原则上不召开、延期或减少召开集中会议。



12 集中供餐的单位,应注意饮食安全与卫生,建议采用分餐制、错峰就餐等形式,避免聚集就餐,并加强对餐具的消毒及管理。

二 办公场所发现疑似病例或确诊病例

01 若办公场所出现疑似病例或确诊病例,单位负责人应主动报告所在地区卫生健康部门,并配合开展现场调查和消毒等工作。

02 病例排出的污染物(血液、分泌物、呕吐物、排泄物等)及其可能污染的物品和场所,如办公室区域地面、桌椅、个人物品等需在卫生健康部门专业人员的指导下进行终末消毒。

03 未采取有效防护措施的共同工作者、同室人员,或其他经专业人员现场调查后确认为符合密切接触者标准者,需进行14天隔离医学观察。如疑似病例经实验室检测排除,则其密切接触者可停止隔离返回工作岗位。

04 立即关闭病例所在区域对应的集中空调通风系统,并对其进行强制清洗消毒。



05 所有人员佩戴医用外科口罩。



06 停止大型会议、工间操、联欢、聚餐等群体性活动。